


男性型脱毛症（AGA）治療薬

1) デュタステリド

新しい男性型脱毛症治療内服薬です。保険はききません。成人男性しか使用できません。フィナステリドと作用機序は同じで男性ホルモン合成を阻害しますが、効果は1.5倍以上とされています。その副作用としての、勃起不全・性欲減退・女性化乳房・肝機能異常などがやや多いとされています。1日1回、半年以上の服用が必要で効果が出ても続けないと持続しません。内服中は前立腺癌検査のPSA値を下げるので注意が必要です。またエイズ内服治療中の人は濃度が上がりやすいので併用時は注意が必要です。内服を止めても血中濃度が下がるのが遅いので中止後6か月間は検血を控えてください。肝機能異常発見のため健康診断は必ず受けてください。当院では自費の診察料と処方箋料が必要で薬は最寄の薬局で購入してください。



2) フィナステリド

以前より使用中の男性型脱毛症治療内服薬です。保険はききません。成人男性しか使用できません。副作用として、勃起不全・性欲減退・女性化乳房・肝機能異常などがありますが1%以下です。1日1回、半年以上の服用が必要で続けないと効果が持続しません。内服中は前立腺癌検査のPSA値を下げるので注意が必要です。内服を止めると血中濃度は早く下がるのですが念のため検血は中止後1か月間控えてください。肝機能異常発見のため健康診断は必ず受けてください。当院では自費の診察料と処方箋料が必要で薬は最寄の薬局で購入してください。

3) ミノキシジル

市販薬の男性型脱毛症治療外用薬で1日2回頭皮に塗布します。薬局で購入してください。作用機序は血管拡張による頭皮の血行改善で上記内服薬と併用もできます。外用薬のためかぶれる心配があります。